

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP25-7-74 261598

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

## EDITION DE LA STATION RHONE - ALPES

(AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE)

55 Rue Mazenod 69426 LYON CEDEX 3

Tél. 60-95-87 (Postes 426 et 427)

ABONNEMENT ANNUEL : 30 F

C. C. P. LYON 9431-17  
Régisseur Avances et Recettes D. D. A.  
55, Rue Mazenod — 69 — LYON-3\*

Lisez sur l'enveloppe de ce bulletin le numéro de votre région

BULLETIN n° 14

9 Juillet 1974

### VIGNE

MILDIOU - Renouveler 3 à 5 jours après la prochaine précipitation importante dans les seules parcelles où la maladie est présente.

BLACK-ROT - Dans l'ensemble des zones contaminées, assurer la protection des grappes dès réception. (contaminations du 26 au 29 Juin)

BOTRYTIS - Dans toutes les vignes où la maladie est présente, sur feuilles ou sur rafles (avec en général dessèchement des grains) assurer une protection continue.

TORDEUSES de la GRAPPE - Par suite de la quasi généralisation du second vol, un premier traitement contre la 2ème. génération de chenilles sera exécuté dès réception (vers le 15 avec les produits à action en profondeur) dans les régions non concernées par le précédent bulletin, à l'exception de la tranche d'altitudes les plus élevées des vignobles (150 à 200 m.).

Renouveler ce traitement au moins une fois dans les régions concernées par le précédent bulletin.

### ARBRES FRUITIERS

TORDEUSE ORIENTALE - Maintenir la protection en toutes régions.

CARPOCAPSE - Une "queue" de premier vol d'une certaine importance nécessite le renouvellement des traitements dans toutes les régions déjà concernées y compris dans les régions 131, 132, 142, 147 et 152. Il suivra le précédent de 12 à 6 jours suivant l'importance des précipitations survenues entre temps.

PSYLLE du POIRIER - Nous rappelons que les traitements ne sont réellement efficaces que contre les larves les plus jeunes.

### CULTURES DIVERSES

MILDIOU de la POMME de TERRE et de la TOMATE - A partir du stade favorable effectuer des traitements de 2 à 4 jours après chaque humectation prolongée (pluie ou aspersion).

En règle générale, le premier traitement sur tomate n'est entrepris que lors de l'application du second sur pomme de terre.

Un ou plusieurs de ces traitements peuvent être supprimés si les températures s'élèvent entre temps au dessus de 29° pendant plusieurs jours consécutifs.

Toutefois sur tomate, dans les secteurs où Alternaria sévit habituellement, cette suppression est déconseillée.

### CLIMATOLOGIE

Le PRINTEMPS 1974 - (suite)

- Précipitations - Le déficit, réparti sur les trois mois, porte principalement sur Avril (3mm6 seulement du 1er au 26 à Lyon); il est toutefois moins net dans le sud de la région où Avril a été au contraire assez arrosé.

- Insolation - Seule la période du 6 au 23 Avril a été très ensoleillée, le déficit étant assez uniforme dans tout le reste de la saison.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie, Chef de la Circonscription: A. PITHILOUD  
L'Ingénieur d'Agronomie chargé des Avertissements Agricoles: P. LATARD

Directeur-gérant: L. BOUYX

Imprimerie de la Station Rhône-Alpes

7194